

ยาตีกัน

เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยรับประทานหรือใช้ยา

ร่วมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป

แล้วทำให้ผลการรักษาจากยาตัวใดตัวหนึ่ง
เปลี่ยนไป อาจไม่ได้ผลในการรักษา
หรือเกิดอาการข้างเคียงจากยาเพิ่มมากขึ้น



ผู้ป่วยจะต้องได้รับยาสม่ำเสมอและเคร่งครัด
และต้องระวังปัญหาการเกิดยาตีกัน ซึ่งอาจทำให้
ยาต้านมะเร็งไม่ได้ผลหรือเกิดอาการข้างเคียงมากขึ้น

ยาตีกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การใช้ยารักษาโรคมะเร็ง

เมื่อใช้ในขนาดต่ำเกินไปจะไม่ให้ผลในการรักษา
แต่เมื่อใช้ในขนาดสูงเกินไป
จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากขึ้น
และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ซึ่งระหว่างการให้

จะมีการคำนวณขนาดยา
อ้างอิงตามพื้นที่ผิวร่างกายของผู้ป่วย
มากกว่าใช้น้ำหนักตัว
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
ขนาดยาที่ใช้ได้เหมาะสม
มากกว่า



สำหรับยาต้านมะเร็ง อาจต้องระวังเรื่องยาตีกัน
สำหรับกลุ่มยาต่อไปนี้ เช่น



ยาลดกรด



ยาปฏิชีวนะ



ยาต้าน
การแข็งตัว
ของเลือด



ยาฆ่าเชื้อรา



ยาด้าน HIV



ยาสเตียรอยด์



ยา NSAIDs



ยากันชัก



สมุนไพร

ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ หรือเภสัชกร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ยากับตนเอง
และอย่าลืมว่า

“มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร”

